Der Inhalt dieses Dokuments dient lediglich als Beispiel. Die aktuellste Version finden Sie in unserem geschützten Downloadbereich unter https://www.coachrom.com/insert. Bei Bedarf senden wir sie Ihnen aber auch gerne zu, bitte anfordern unter: info@coachrom.com

HYPHEN BioMed

Vertrieb und Support:
CoaChrom Diagnostica GmbH
www.coachrom.com | info@coachrom.com
Tel. +43-1-236 222 1 | Fax +43-1-236 222 111
Kostenfreie Nummern für Deutschland:
Tel. 0800-24 66 33-0 | Fax 0800-24 66 33-3

Tris-NaCl Buffer pH 7.40 Set of 4x20 mL

REF. AR028K

For *in-vitro* use only

PRESENTATION:

Buffer containing Tris (Tris (hydroxymethyl) aminomethane) (6.1 g/L), Sodium Chloride (8.77 g/L) and 0.9 g/L Sodium Azide (as preservative).

*CAUTION: Sodium Azide (NaN_3) may react with lead and copper plumbing to form highly explosive metal azides. Flush with large volumes of water when discarding into a sink.

This kit is for research use only and should not be used for patient diagnosis or treatment.

USE:

For in vitro use only.

Vials of 20 mL, ready to use.

Dilution buffer for biological tests.

Can be used as buffer recommended by the US and EU Pharmacopoeia for the assay of heparin anti-IIa and anti-Xa activity, verified and validated in combination with BIOPHEN™ ANTI-IIa (2 Stages Heparin Assay, ref. 220005) and BIOPHEN™ ANTI-Xa (2 Stages Heparin Assay, ref. 221005) kits.

Notes:

- For instructions concerning the tests to be performed, refer to the specific associated kit inserts.
- Take care of stabilizing the solution at room temperature (18-25°C) prior to use.

The results obtained should be for research purposes only and not used for patient diagnosis or treatment.

PH:

7.40

STABILITY:

In its original vial, unopened and kept at 2-8°C, stable until the expiration date printed on the label.

When open, protected from any contamination, this solution is stable for 4 weeks at 2-8°C.

Tris-NaCl Puffer pH 7,40 Set mit 4x20 mL

Art.Nr. AR028K

Nur für *in-vitro*-Forschungszwecke

ZUSAMMENSETZUNG:

Dieser Puffer enthält Tris (Tris (Hydroxymethyl) Aminomethan) (6,1 g/L), Natriumchlorid (8,77 g/L) und 0,9 g/L Natriumazid (als Konservierungsmittel).

*Warnung: Natriumazid (NaN_3) kann mit Blei- oder Kupferarmaturen unter Bildung hochexplosiver Metallazide reagieren. Bei der Entsorgung über das Abwasser muss mit großen Mengen Wasser nachgespült werden.

Dieses Produkt darf nur für *in-vitro*-Forschungszwecke genutzt werden.

VERWENDUNG:

Nur zum *in-vitro*-Gebrauch.

Flaschen mit je 20 mL Inhalt, gebrauchsfertig.

Verdünnungspuffer für biologische Tests.

Kann als Puffer gemäß der Empfehlungen von US- und EU-Pharmacopoeia bei der Bestimmung von Heparin mit Anti-IIa- und Anti-Xa-Methoden verwendet werden und ist für die Anwendung in Kombination mit den Testkits BIOPHEN™ Anti-IIa (2-Stufen-Heparin-Test, Art.Nr. 220005) und Biophen™ Anti-Xa (2-Stufen-Heparin-Test, Art.Nr. 221005) geprüft und validiert.

Anmerkungen:

- In Bezug auf die durchzuführenden Tests sind die Anweisungen des für den Testkit spezifischen Beipackzettels zu befolgen.
- Vor dem Gebrauch die Lösung bei Raumtemperatur (18-25°C) stabilisieren.

Die erhaltenen Ergebnisse dürfen nur zu Forschungszwecken verwendet werden und nicht der Diagnose oder Behandlung von Patienten dienen.

PH:

7,40

STABILITÄT:

Ungeöffnete Reagenzien müssen bei 2-8°C in der Originalverpackung gelagert werden und sind dann bis zu dem auf der Verpackung aufgedruckten Verfallsdatum stabil.

Geöffnet und vor jeglicher Kontamination geschützt ist die Lösung bei 2-8°C für 4 Wochen stabil.